

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При получении ранения пострайтесь сами себе перевязать рану куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии фонтаном. Для остановки кровотечения необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени – согнуть ногу в коленном суставе; при кровотечении на бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече – жгут чуть ниже плечевого сустава.

При венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей тёмного или почти чёрного цвета. Необходимо максимально поднять конечность и наложить тугую повязку. После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зелёной, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистым куском ткани и наложить повязку бинтом.

Боль при ранении может привести пострадавшего к шоковому состоянию. В этом случае необходимо использовать обезболивающие

средства, обеспечить максимальное тепло пострадавшему.

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трёхслойную повязку. Повязку необходимо прибинтовать к поражённому месту. Она присохнет, но должна сама отходить от раны по мере заживления.

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивая покой, так как ранению в голову обычно

相伴隨著顫動。頭部的創傷（除了面部創傷）最好不要觸碰。在面部創傷的情況下，應當用無菌布帶緊密地包扎創傷。在骨科創傷的情況下，必須將其固定住，並在到達醫護人員之前不進行任何操作。

在胸部和腹部創傷的情況下，為防止空氣進入胸腔或腹腔，應當在創傷處包扎一個不透氣的繃帶。在最糟糕的情況下，應當將手放在創傷處，並緊密地包扎住。

**При оказании первой помощи
в случаях ранения
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:
промывать рану, извлекать любые
иностранные тела, класть в рану вату,
смоченную йодом.**

112

Единая дежурно-диспетчерская
служба Волгограда

01

Пожарная служба

02

Полиция

03

Скорая медицинская
помощь

04

Служба газа